

# Ihr Materialbestellformular – Informationen und Material zu Eliquis®

Praxis/Name: \_\_\_\_\_

Strasse/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Ihr Kontakt

Kundendienst

041 767 72 00

eliquis-ch@bms.com

**Eliquis®**  
Apixaban



## Pocket Guide für Ärztinnen & Ärzte

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



## Patient:innenbroschüre Therapietreue

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



## Patient:innenbroschüre Vorhofflimmern

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



## Patient:innenbroschüre VTE/LE

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



## Patient:innenbroschüre Orthopädie

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



## Eliquis Einnahme-Kalender für Patient:innen

## Bestellmenge

Deutsch

Anzahl: \_\_\_\_\_

Français

Anzahl: \_\_\_\_\_

Italiano

Anzahl: \_\_\_\_\_



Bristol Myers Squibb®



### Eliquis E-Service:

Nutzen Sie den Eliquis E-Service? Eliquis in a box ist ein E-Service, der Ihnen Inhalte zur Verfügung stellt, die für Sie wichtig sind. Holen Sie sich einfach und kompakt alle Informationen zum Download. Auf Anfrage sind auch Risiko-minimierende Materialien der Pharmakovigilanz-Abteilung zu bestellen. Scannen Sie den QR-Code für ihren sofortigen Zugang.



Ich wünsche Informationsmaterial über die Anwendung oder Studienergebnisse zu Eliquis®

Ich wünsche einen Besuch durch den Aussendienst.

Sie möchten sich zum Service „Antikoagulation im Fokus“ anmelden und Event-Informationen erhalten? Dann registrieren Sie sich bitte über den folgenden Link oder über den QR Code:  
<https://www.consent.bmsinformation.com/reg?cnt=ch>



### Für offene Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

#### Kundendienst

Bristol-Myers Squibb SA/Pfizer AG

Telefon: 041 767 72 00

E-mail: [eliquis-ch@bms.com](mailto:eliquis-ch@bms.com)

### Medizinische Anfragen

Telefon: +41 (0)41 767 72 55

E-mail: [medinfo.switzerland@bms.com](mailto:medinfo.switzerland@bms.com)

[www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch)

Die vollständige Fachinformation zu Eliquis® finden Sie auf [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch)

### Pharmacovigilance

Medizinische Fachpersonen sind aufgefordert, alle Verdachtsfälle unerwünschter Arzneimittelwirkungen an Swissmedic (siehe [www.swissmedic.ch/marktueberwachung/](http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/)) zu melden. Verdachtsfälle sollten auch an Bristol-Myers Squibb SA gemeldet werden: Bristol-Myers Squibb SA, Medical Information, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Tel: 041/ 767 72 55, Fax: 041/767 73 75, E-Mail: [medinfo.switzerland@bms.com](mailto:medinfo.switzerland@bms.com)

**Eliquis®**  
Apixaban

**Eliquis®** (Apixaban). **I:** a) Prävention venöser thromboembolischer Ereignisse bei erwachsenen Patienten nach elektiver Hüft- oder Knieersatzoperation. b) Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie bei erwachsenen Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern. c) Behandlung von tiefer Venenthrombose (DVT) und Lungenembolie (PE) und Prävention einer rezidivierenden DVT und PE bei erwachsenen Patienten. **D:** a) 2,5 mg 2x/d. b) 5 mg 2x/d; 2,5 mg 2x/d bei Patienten mit mind. 2 der folgenden Kriterien: Alter  $\geq 80$  Jahre, Körpergewicht  $\leq 60$  kg oder Serumkreatinin  $\geq 1,5$  mg/dl (133  $\mu\text{mol/l}$ ). c) Behandlung von DVT oder PE: 10 mg 2x/d während 7 Tagen, anschliessend 5 mg 2x/d; Prävention einer rezidivierenden DVT oder PE: 2,5 mg 2x/d nach Abschluss einer mind. 6-monatigen Therapie mit Eliquis 5 mg 2x/d oder einem anderen Antikoagulans. Nicht empfohlen bei Patienten mit Kreatinin-Clearance  $< 15$  ml/min. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff oder Hilfsstoffen. Klinisch relevante aktive Blutung. Lebererkrankungen, die mit Koagulopathie und klinisch relevantem Blutungsrisiko einhergehen, schwere Leberinsuffizienz (Child Pugh C). **VM:** Zustände mit erhöhtem Blutungsrisiko. Spinale/epidurale Anästhesie oder Punktion sowie bei postoperativer Anwendung von epiduralen Verweilkathetern (epidurale oder intrathekale Verweilkatheter spätestens 5 Stunden vor erster Eliquis®-Gabe entfernen). Gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln mit Wirkung auf die Hämostase. Schwere Niereninsuffizienz. Nicht empfohlen nach Hüftfrakturoperation, bei Patienten mit künstlichen Herzklappen, bei Patienten mit Antiphospholipid-Syndrom, während Schwangerschaft/Stillzeit, bei Lungenembolie bei hämodynamisch instabilen Patienten oder Patienten, die eine Thrombolyse oder pulmonale Embolektomie benötigen. Enthält Lactose. **IA:** Vorsicht bei gleichzeitiger Verabreichung starker Inhibitoren und Induktoren von CYP3A4 und P-gp, Inhibitoren der Thrombozytenaggregation, NSAIDs (einschliesslich ASA), P2Y12-Inhibitoren. Nicht empfohlen bei gleichzeitiger Anwendung mit anderen Antikoagulantien oder Wirkstoffen, welche mit schwerwiegenden Blutungen in Zusammenhang gebracht werden. Beeinflussung von Gerinnungsparametern. **Häufige UAW:** Anämie, Blutungen im Auge, Blutung, Hämatom, Epistaxis, Übelkeit, GI und rektale Blutung, Zahnfleischbluten, Hämaturie, Menorrhagie, Kontusion. **P:** Filmtabletten zu 2,5 mg: 20, 56, 100, 168. Filmtabletten zu 5 mg: 56, 100, 168. Verkaufskategorie B. **Zulassungsinhaber:** Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). (V024)

Pfizer AG  
Schärenmoosstrasse 99  
8052 Zürich  
[www.pfizer.ch](http://www.pfizer.ch)

Bristol-Myers Squibb SA  
Hinterbergstrasse 16  
6312 Steinhausen  
[www.bms.ch](http://www.bms.ch)

[www.eliquis.ch](http://www.eliquis.ch)



Bristol Myers Squibb®

